

ABICIN® Harzlack 30 %

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie Abicin® verwenden. Das Produkt ist für die medizinische Selbstversorgung bestimmt.

Abicin® 30% Harzlack wird aus dem gereinigten Harz norwegischer Fichten (*Picea abies*) hergestellt. Die Reinheit des Lacks und seine biologische Wirkung auf bestimmte Pilze und Bakterien werden in allen Herstellungsphasen geprüft.

Wirkstoffe:

Gereinigtes Harz norwegischer Fichten (*Picea abies*). Der Harzanteil im Wirkstoff beträgt 30%. Der Lack riecht stark nach Harz und ist gleichmäßig braun.

Inhaltsstoffe INCI):

Gereinigtes Harz norwegischer Fichten (*Picea abies*), Denaturierter Alkohol, Monopropylenglykol, Glycerol.

Anwendungsbereiche:

Wird zur Verbesserung von Nagelpilzen, Fußpilz und Nagelwallentzündungen als unterstützende Behandlung eingesetzt. Abicin® 30% Harzlack unterstützt die Heilung von Bakterieninfektionen und Pilzen (Dermatophyten, *Trichophyton*-Pilze), durch welche Nagelpilze entstehen. Der Harzanteil im Lack ist ausreichend hoch, um die bestmögliche Wirkung zur Vorbeugung des Wachstums von Nagelpilzen zu gewährleisten.

Gebrauchsanweisung:

Zur Verdünnung eines dick gewordenen Nagels empfehlen wir, eine professionelle Fußpflege aufzusuchen. Zu Hause kann die Nageloberfläche bei Bedarf mit einer Feile abgeschliffen, gewaschen (aufgeweicht) und abgetrocknet werden, bevor Sie Abicin® 30% Harzlack auftragen. Der Lack wird mit dem Pinsel im Verschluss dünn auf den zu behandelnden Bereich aufgetragen und trocknen lassen. Nach ca. 30 Minuten ist der Lack erstarrt. Der infizierte Bereich (der Nagel, der Wurzelbereich des Nagels und der Nagelwall) wird einmal pro Tag mit Abicin® 30% Harzlack behandelt. Die Behandlung wird fortgesetzt, bis der Nagel vollständig abgeheilt ist. Bei Nagelpilzinfektionen an den Zehen kann die Behandlung bis zu 9-12 Monate dauern. Die Behandlung ist geglückt, wenn anstelle des befallenen Nagels ein neuer gesunder Nagel gewachsen ist. Verwenden Sie während der Behandlung mit Abicin® keine Kunstnägels oder kosmetischen Nagellacke. Bei einer Fußpilzkrankung wird der Abicin® 30% Harzlack einmal pro Tag auf den zu behandelnden Bereich aufgetragen, bis die Haut geheilt ist. Eine bakterielle Nagelwallentzündung heilt innerhalb von 1-3 Wochen.



= Haltbarkeit geöffnet: 12 Monate

Aufbewahrung / Haltbarkeit:

Der Verschluss der Lackflasche muss sorgfältig geschlossen werden, um Verdunstung zu vermeiden. Die Flasche muss vor Gebrauch geschüttelt werden. Wird mit geschlossenem Verschluss an einem sauberen Ort bei Zimmertemperatur aufbewahrt. Das ungeöffnete Produkt ist bei Zimmertemperatur mindestens 4 Jahre lang haltbar. Die Haltbarkeit des Produkts nach dem Öffnen der Flasche bei Zimmertemperatur beträgt 1 Jahr.

Schwangerschaft, Stillzeit und Kinder:

Abicin® 30% Harzlack darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht verwendet werden. Vor der Verwendung bei Kindern sollte der Rat eines Arztes eingeholt werden. Über eventuelle gesundheitliche Schädigungen während der Schwangerschaft oder Stillzeit oder bei Kindern ist nichts bekannt.

Wechselwirkungen:

Es sind keine klinisch relevanten Wechselwirkungen bekannt.

Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit:

Keine Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit, Maschinen zu bedienen.

Nebenwirkungen:

Abicin® 30% Harzlack darf nicht von Personen verwendet werden, die allergisch auf Naturharze reagieren. Das Produkt enthält Harze, aufgrund welcher der Lack allergische Hautreaktionen bei Harzallergikern (allergische Kontaktdermatitis) hervorrufen kann. Weitere Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Wenn Sie zweifeln, ob Sie auf Naturharze allergisch sind, verteilen Sie Abicin® 30% bei der ersten Verwendung auf einem kleinen Hautbereich. Wenn Reizungen oder allergische Reaktionen (Juckreiz, Rötungen, Schwellungen, Blasenbildung u.ä.) innerhalb von 3 Tagen auftreten, darf der Abicin® Harzlack nicht verwendet werden. Wenn die allergischen Reaktionen zu einem späteren Zeitpunkt der Behandlung auftreten, muß die Verwendung unverzüglich abgebrochen und auf eine andere Behandlung zurückgegriffen werden. Kontaktieren Sie bei Bedarf einen Arzt. Während der Behandlung kann der Nagel ausbleichen, spröde werden oder Risse bilden.

Sonstiges:

Über die Verwendung und Effizienz des Lacks werden derzeit Forschungen angestellt. Wir möchten Sie bitten, uns eventuelle Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, allergische Reaktionen u.ä. unverzüglich mitzuteilen.

Hersteller:

Repolar GmbH
Päiväperhontie 5, FI-02210 ESPOO, FINLAND
PF 26, FI-02101 ESPOO, FINLAND
www.repolar.com
Email: asiakaspalvelu@repolar.com